Une faune riche liée à un milieu de transition

Espèces remarquables utilisant les espaces naturels comme zone de nourrissage

Sterne Pierregarin
Etang des Trois Parts et canal

Milan Noir
Piste de l'aérodrome

Faucon Hobereau
Mare aux moules

Champs à l'ouest - Continuité écologique

Bruant Proyer

Alouette des Champs

Renard Roux

Chevreuil de Plaine

Milieu humide

Amphibiens : espèces protégées en France

Grenouille Verte
Etang des Trois Parts et Tréville

Crapaud Commun
Fossé à côté de la Grande Brèche

Ragondin – *canal*
nuisible en Essonne

Parcs et jardins

Hérisson

Espèces d'intérêt

Ophrys Abeille

Orchis Bouc

Présents

Taupe

Lapin de Garenne

Lièvre

Source : Etude de définition, Alphaville-Biotope-TNPlus, mars 2009

LES PORTES DE BONDOUFLE

Milieu des « mares et zones humides »

Des espèces relativement communes et adaptées peuvent être plantées en faibles quantités pour permettre une colonisation plus naturelle

Bords de mares

Jonc épars *Juncus effusus*

Massette à larges feuilles *Typha latifolia*

Rubanier dressé *Sparganium erectum*

Iris faux-acore *Iris pseudacorus*

Menthe aquatique *Mentha aquatica*

Centre de la mare

Nénuphar *Nuphar lutea*

Cératophylle *Ceratophyllum demersum*

Jonc Epars

Massette à larges feuilles

Rubanier Dressé

Iris Faux-acore

Menthe Aquatique

Nénuphar

Cératophylle

Amphibiens : espèces protégées en France

Grenouille Verte
Etang des Trois Parts et Tréville

Crapaud Commun
Fossé à côté de la Grande Brèche

Ragondin – *canal nuisible en Essonne*

Cortège

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

Goéland argenté *Larus argentatus*

Héron cendré *Ardea cinerea*

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Bergeronnette des Ruisseaux

Canard Colvert

Gallinule Poule d'Eau

Goéland Argenté

Mouette Rieuse

Héron Cendré

Rousserolle Effarvatte

Sterne Pierregarin

Faucon Hobereau
Mare aux moules

Source : Etude de définition, Alphaville-Biotope-TNPlus, mars 2009

LES PORTES DE BONDOUFLE

Milieu « chênaie-charmaie »

Ligneux

Poirier	Pyrus sylvestris
Aubépine épineuse	Crataegus laevigata
Chèvrefeuille	Lonicera periclymenum
Charme	Carpinus betulus
Alouchier	Sorbus aria
Eglantier	Rosa canina
Clematite blanche	Clematis vitalba
Cornouiller mâle	Cornus mas
If	Taxus baccata
Nerprun purgatif	Rhamnus cathartica
Prunier de Ste Lucie	Prunus mahaleb
Viorne lantane	Viburnum lantana
Troène commun	Ligustrum vulgare
Pommier sauvage	Malus sylvestris
Prunellier noir	Prunus spinosa
Tilleul à grandes feuilles	Tilia platyphyllos
Tilleul à petites feuilles	Tilia cordata
Erable champêtre	Acer campestre
Merisier	Prunus avium
Aubépine monogyne	Crataegus monogina
Fusain d'Europe	Evonymus europaeus
Noisetier	Corylus avellana
Erable plane	Acer platanoides
Chêne pédonculé	Quercus robur
Hêtre	Fagus sylvatica
Frêne élevé	Fraxinus excelsior
Alisier torminal	Sorbus torminalis
Erable sycomore	Acer pseudoplatanus
Cornouiller sanguin	Cornus sanguinea
Houblon	Humulus lupulus
Lierre grimpant	Hedera helix

Herbacées du sous-bois

Cortège des boisements, bosquets et buissons

Poirier

Aubépine Epineuse

Chèvrefeuille

Charme

Alouchier

Eglantier

Clematite Blanche

Cornouiller Mâle

If

Nerprun Purgatif

Prunier de Ste Lucie

Viorne Lantane

Troène Commun

Pommier Sauvage

Prunellier Noir

Tilleul à Grandes et Petites feuilles

Erable Champêtre

Merisier

Aubépine Monogyne

Fusain d'Europe

Noisetier

Erable Plane

Chêne Pédonculé

Hêtre

Frêne Elevé

Alisier Torminal

Erable Sycomore

Cornouiller Sanguin

Houblon

Lierre Grimpant

Source : Etude de définition, Alphaville-Biotope-TNPlus, mars 2009

LES PORTES DE BONDOUFLE

Milieu « chênaie-charmaie »

Ligneux

Herbacées du sous-bois

Cortège des boisements, bosquets et buissons

Agrostide des Chiens	*Agrostis canina*
Anémone des Bois	*Anemone nemorosa*
Gouet Tacheté	*Arum maculatum*
Canche Cespiteuse	*Deschampsia cespitosa*
Fougère Mâle	*Dryopteris filix-mas*
Épilobe en Epi	*Epilobium angustifolium*
Lierre Terrestre	*Glechoma hederacea*
Grande Berce	*Heracleum sphondylium*
Ortie Jaune	*Lamium galeobdolon*
Luzule de Forster	*Luzula forsteri*
Luzule à Nombreuses Fleurs	*Luzula multiflora*
Mercuriale Vivace	*Mercurialis perennis*
Millet Diffus	*Milium effusum*
Jonquille des Bois	*Narcissus pseudonarcissus*
Parisette à Quatre Feuilles	*Paris quadrifolia*
Sceau de Salomon Multiflore	*Polygonatum multiflorum*
Primevère Officinale	*Primula veris*
Brunelle Commune	*Prunella vulgaris*
Patience Sanguine	*Rumex sanguineus*
Épiaire des Bois	*Stachys sylvatica*
Violette Odorante	*Viola odorata*

Agrostide des Chiens

Anémone des Bois

Gouet Tacheté

Canche Cespiteuse

Fougère Mâle

Epilobe en Epi

Lierre Terrestre

Grande Berce

Ortie Jaune

Luzule de Forster

Luzule à Nombreuses Fleurs

Mercuriale Vivace

Millet Diffus

Jonquille des Bois

Parisette à Quatre Feuilles

Sceau de Salomon Multiflore

Primevère Officinale

Brunelle Commune

Patience Sanguine

Epiaire des Bois

Violette Odorante

Source : Etude de définition, Alphaville-Biotope-TNPlus, mars 2009

Milieu « chênaie-charmaie »

Ligneux

Accenteur Mouchet *Prunella modularis*
Bruant Jaune *Emberiza citrinella*
Chardonneret Elégant *Carduelis carduelis*
Corneille Noire *Corvus corone*
Etourneau Sansonnet *Sturnus vulgaris*
Faucon Crécerelle *Falco tinnunculus*
Faucon Hobereau *Falco subbuteo*
Fauvette à Tête Noire *Sylvia atricapilla*
Fauvette Grisette *Sylvia communis*
Geai des Chênes *Garrulus glandarius*
Grimpereau des Jardins *Certhia brachydactyla*
Grive Musicienne *Turdus philomelos*
Hypolaïs Polyglotte *Hippolais polyglotta*
Merle Noir *Turdus merula*
Mésange Bleue *Parus caeruleus*
Mésange Charbonnière *Parus major*
Pic Epeiche *Dendrocopos major*
Pie Bavarde *Pica pica*
Pigeon Ramier *Columba palumbus*
Pinson des Arbres *Fringilla coelebs*
Pouillot Véloce *Phylloscopus collybita*
Roitelet Huppé *Regulus regulus*
Rougegorge Familier *Erithacus rubecula*
Tourterelle des Bois *Streptopelia turtur*
Troglodyte Mignon *Troglodytes troglodytes*
Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

Herbacées du sous-bois

Cortège des boisements, bosquets et buissons

Accenteur Mouchet

Bruant jaune

Chardonneret Elégant

Corneille Noire

Etourneau Sansonnet

Faucon Crécerelle

Faucon Hobereau

Fauvette à Tête Noire

Fauvette Grisette

Geai des Chênes

Grimpereau

Grive Musicienne

Hypolaïs Polyglotte

Merle Noir

Mésange Bleue

Mésange Charbonnière

Pic Epeiche

Pie Bavarde

Pigeon Ramier

Pinson des Arbres

Pouillot Véloce

Roitelet Huppé

Rouge-gorge Familier

Tourterelle des Bois

Troglodyte Mignon

Verdier d'Europe

Source : Etude de définition, Alphaville-Biotope-TNPlus, mars 2009

LES PORTES DE BONDOUFLE

Milieu « zone de culture »

Cortège

Alouette des Champs *Alauda arvensis*

Bergeronnette Grise *Motacilla alba*

Bergeronnette Printanière *Motacilla flava*

Bruant Proyer *Miliaria calandra*

Linotte Mélodieuse *Carduelis cannabina*

Milan Noir *Milvus migrans*

Perdrix Grise *Perdix perdix*

Pipit Farlouse *Anthus pratensis*

Alouette des Champs

Bergeronnette Grise

Bergeronnette Printanière

Bruant Proyer

Linotte Mélodieuse

Milan Noir

Perdrix Grise

Pipit Farlouse

Renard Roux

Chevreuil de Plaine

Source : Etude de définition, Alphaville-Biotope-TNPlus, mars 2009

Milieu « Ville et village »

Cortège

Hirondelle de Fenêtre *Delichon urbica*

Martinet Noir *Apus apus*

Moineau Domestique *Passer domesticus*

Pigeon Biset *Columba livia*

Rouge-queue Noir *Phoenicurus ochruros*

Tourterelle Turque *Streptopelia decaocto*

Hirondelle de Fenêtre

Martinet Noir

Moineau Domestique

Pigeon Biset

Rouge-queue Noir

Tourterelle Turque

Source : Etude de définition, Alphaville-Biotope-TNPlus, mars 2009

Cas particulier du Bois de Saint-Eutrope

Bois de Saint Eutrope – cas particulier

Etat des connaissances et des protections
des enjeux concentrés

Espace naturel sensible (ENS)
outil d'inventaire du Département de l'Essonne

ZNIEFF de type I sur le secteur central du bois
Souligner le caractère patrimonial des milieux naturels ouverts qui y subsistent

Flore remarquable pour la région

Zone classée en ZNIEFF de type 1 pour :

2 milieux déterminants
Formations amphibies, et rives exondées, des lacs, étangs et mares
Chênaies-charmaies

Ces trois espèces et la richesse floristique globale du site, unique pour les communes environnantes, démontrent l'intérêt de ce bois situé en zone péri-urbaine, très fréquenté.

Trois espèces végétales remarquables

Etoile d'Eau

Etoile d'eau (*Damasonium alisma*)
Très rare et protégée au niveau national
Présente au niveau de petites dépressions humides situées sur et à proximité des parcelles cultivées du cœur du bois de Saint-Eutrope.
Présence variant selon les années

Dryoptéris
Ecailleuse

Dryoptéris écailleuse (*Dryoptéris affinis subsp. Borreri*)
Rare
Sixième station connue pour l'Essonne
Présence ici remarquable

Polystic à Aiguillons

Polystic à aiguillons (*Polystichum aculeatum*)
Assez rare et protégé au niveau régional
Station représentant un isolat géographique pour la région, accentuant sa valeur patrimoniale

Source : Etude de définition, Alphaville-Biotope-TNPlus, mars 2009

LES PORTES DE BONDOUFLE